INDEX PERFECTUS

AD

CAROLI LINNÆI

SPECIES PLANTARUM,

NEMPE EARUM

PRIMAM EDITIONEM,

(ANNO 1753).

COLLATORE

FERDINANDO DE MUELLER.

Melbourne:

M'CARRON, BIRD & SOCII IMPRESSERUNT.

MDCCCLXXX.

[illegible] coll. compl. of Wm.

INDEX PERFECTUS

AD

Carolus Linnaeus

CAROLI LINNÆI

SPECIES PLANTARUM,

NEMPE EARUM

PRIMAM EDITIONEM,

(ANNO 1753).

COLLATORE

FERDINANDO DE MUELLER.

Melbourne:

M'CARRON, BIRD & SOCII IMPRESSERUNT.

MDCCCLXXX.

LIBER aureus Linnæi anno MDCCLIII promulgatus, quo vir immortalis primum nomina plantarum specifica constituit, diu adeo rarescebat, ut etiam in operibus phytographorum praestantissimis fere semper tantummodo editio secunda specierum plantarum citaretur. Hodie autem prioritatis legem exactam prorsus in phytographia agnoscimus, quare verum hujus scientiæ recentioris fundamentum ex multis annis fere occultum iterum lustrare necesse habeo. Codex quoque Richteri (anno 1835) cum indice Petermanni (anno 1840) omnium operum Linnæi parum in usum constantem venit, tametsi amplissimus atque eximius; igitur indicem hunc modestum et simplicem primo pro meorum operum scribendi facilitate solummodo constructum nunc etiam usui forsan commodo præsertim amicorum offerre audeo.

INDEX PERFECTUS

AD

CAROLI LINNÆI

SPECIES PLANTARUM.

annua, 847; tanacetifolia, Absinthium, vulgaris, integrifolia, cœrulescens, 848; Dracunculus, chinensis, maderaspatana, minima, 849.

Arum— Dracunculus, Dracontium, pentaphyllum, 964; triphyllum, trilobatum, Colocasia, esculentum, macrorrhizon, 965; peregrinum, divaricatum, sagittæfolium, maculatum, virginicum, proboscideum, Arisarum, 966; ovatum, tenuifolium, arborescens, 967.

Arundo—Bambos, Donax, phragmites, epigejos, 81; Calamogrostis, arenaria, 82.

Asarum—europæum, canadense, virginicum, Hypocistis, 442.

Asclepias—undulata, gigantea, syriaca, amœna, purpurascens, 214; variegata, nivea, incarnata, curassavica, 215; decumbens, lactifera, Vincetoxicum, nigra, fruticosa, 216; sibirica, verticillata, rubra, tuberosa, 217.

Ascyrum—Crux Andreae, 787; hypericoides, villosum, 788.

Aspalathus—astroites, chenopoda, thymifolia, ericifolia, 711; verrucosa, retroflexa, uniflora, araneosa, indica, cretica, tridentata, 712; argentea, callosa, 713.

Asparagus—officinalis, declinatus, falcatus, retrofractus, asiaticus, 313; albus, acutifolius, aphyllus, capensis, sarmentosus, 314.

Asperugo—procumbens, 138.

Asperula—odorata, arvensis, taurina, 103; tinctoria, pyrenaica, cynanchica, 104.

Asphodelus—luteus, fistulosus, 309; ramosus, 310.

Asplenium—rhizophylla, Hemionitis, 1078; Scolopendrium, nidus, serratum, bifolium, 1079; Ceterach, obtusifolium, salicifolium, Trichomanes, dentatum, 1080.

Aster—fruticosus, alpinus, sibiricus, Tripolium, 872; Amellus, divaricatus, dumosus, tenuifolius, 873; linariifolius, linifolius, sedifolius, concolor, rigidus, 874; undulatus, novæ angliæ, ericoides, cordifolius, puniceus, annuus, 875; vernus, indicus, lævis, mutabilis, tradescanti, 876; novi belgii, grandiflorus, miser, reflexus, chinensis, aurantius, 877.

Astragalus—alopecuroides, christianus, capitatus, 755; pilosus, hedysaroides, sulcatus, galegiformis, 756; uliginosus, carolinianus, canadensis, Cicer, microphyllus, 757; glycyphyllos, hamosus, contortuplicatus, boeticus, 758; sesameus, Epiglottis, syriacus, arenarius, Glaux, 759; Onobrychis, alpinus, montanus, vesicarius, physodes, 760; uralensis, monspessulanus, grandiflorus, campestris, trimestris, 761; tragacanthoides, Tragacantha, 762.

Astrantia—major, minor, 235.

Athamanta—Libanotis, sibirica, Oreoselinum, sicula, 244; cretensis, annua, chinensis, Meum, 245; condensata, 1195.

Atractylis—fruticosa, gummifera, humilis, 829; cancellata, 830.

Atragene—zeylanica, alpina, 542; sibirica, capensis, 543.

Atraphaxis—spinosa, undulata, 333.

M'Carron, Bird & Socii, impresserunt.